

CT造影検査 問診表

【問診事項】

○今までに造影剤を使った検査を受けたことがありますか？

なし あり：CT検査、腎臓検査、胆のう検査、心臓カテーテル検査、血管造影検査、MRI検査

○「あり」と答えられた方へ、その時、副作用はありましたか？

なし あり：じんましん、吐き気、嘔吐、その他（ ）

○今までに薬や食べ物でアレルギーが出たことがありますか？

なし あり：（ ）

○今までに「ぜんそく」と言われたことがありますか？

なし あり：(時期) わからない

○今までに「腎臓のはたらきが悪い（腎不全など）」といわれたことがありますか？

なし あり

○現在、心臓の薬を飲んでいますか？その薬の名前が分かれば教えてください。

飲んでいない 飲んでいる：(薬の名前)

○心臓ペースメーカーを装着していますか？

していない している

○薬の量を決めるため、体重を教えてください。

kg

○（女性の方へ）現在、妊娠している可能性がありますか？

なし あり 分からない

ヨード造影剤に関する説明および同意書

説明医師 _____

【ヨード造影剤について】

今回実施する X 線検査 (CT も含む) は「ヨード造影剤」という薬を注射します。造影剤は、病気の有無や性質、範囲などをより正確に調べるために用いるものです。

【ヨード造影剤の副作用】

1. 軽い副作用： 吐き気、動悸、頭痛、かゆみ、くしゃみ、発疹など。検査の 1～数日後に発疹が現れることもあります。これらは治療を要さないか、1～2 回の投薬や注射で回復します。このような副作用の出る確率は、5%以下です。
2. 重い副作用： 呼吸困難、意識障害、血圧低下、腎不全など。このような副作用は専門的な治療が必要で、場合によっては重い後遺症が残る可能性があります。このような副作用の出る確率は 0.01～0.05%です。
3. 病状・体質によっては、0.0005～0.001% (10～20 万人に一人) の割合で死亡する場合があります。
4. 造影剤を注入する際には、
 - 身体が熱くなることがありますが、心配ありません。
 - 勢いよく造影剤を注入するために、血管外に造影剤が漏れることがあります。この場合には、注射したところがはれて、痛みが出てくる可能性があります。基本的には、時間がたてば治ります。

◎検査中は、常に担当者が患者様の様子を観察しており、万一の副作用にも素早く対応できる態勢をとっております。何か変わったことがあれば、すぐに担当者にお声をかけてください。

【同意】

以上の説明により、ヨード造影剤を使用した検査をうけることについて理解できましたので、検査を受けることに同意します。(※同意された場合でも、いつでも撤回することができます。)

記入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

患者または代理人(続柄)： _____ (ご署名) _____ ()